

Diaproof® Pro

Antidiarrhoikum

Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung

- für Tiere:
Kälber, Fohlen, Lämmer und Ziegenlämmer
- frei verkäuflich



Packungsgrößen:
Packung mit
Eimer mit

24 x 100 g
3.000 g

Zusammensetzung

Traubenzucker	38,60 %
Flohsamenschalen (<i>Plantago ovata</i>)	27,00 %
Natriumhydrogencarbonat	7,08 %
Natriumchlorid	4,85 %
Natriumcitrat	3,45 %
Kaliumchlorid	3,30 %
Magnesiumhydroxid	1,07 %
Getrocknete Bierhefe	
Weizenmehl	2,48 %

Zusatzstoffe je Kg

Vitamine:	
Niacinamid, 3a315:	8700 mg
Vitamin E, 3a700	2205 mg

Inhaltsstoffe

Rohprotein	7,70 %
Rohfaser	1,50 %
Fettgehalt	1,00 %
Rohasche	18,10 %
Gesamtzucker	35,10 %
Natrium	4,70 %
Magnesium	0,40 %
Kalium	1,70 %
Chlorid	4,90 %
Bicarbonat	5,04 %
Citrat	2,21 %

Pufferkapazität

69 mmol/l verträglichkeitsfertiger Portion

Anwendungshinweise

- Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall).
- Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen.
- Die gleichzeitige Verfütterung von Milch

- sollte bei Tieren mit Labmagen vermieden werden.
- Bereiten Sie jede Mahlzeit entsprechend der nachfolgenden Tabelle zu und verabreichen Sie sie rasch, bevor es zur Gelbildung kommt. Die Zeit für die Zubereitung und Verabreichung sollte 20 Minuten nicht überschreiten. Es wird empfohlen, den beiliegenden 50 g-Messlöffel zu verwenden.
- Diaproof Pro sollte nicht gleichzeitig mit Spasmolytika oder anderen Elektrolyten verabreicht werden.

Zubereitung der Mahlzeiten

Kälber und Fohlen

- Anmischung der Mahlzeiten wie in der untenstehenden Tabelle angegeben.
- Das Kalb oder Fohlen muss zwischen den Mahlzeiten Zugang zu frischem und sauberem Trinkwasser haben. Für kleine Rassen kann die Mahlzeit auf 1 - 1,5 l reduziert werden und die Menge an Diaproof Pro entsprechend auf 50 g bzw. 75 g angepasst werden.

Lämmer und Ziegenlämmer

- Anmischung der Mahlzeiten wie in der untenstehenden Tabelle angegeben, dann Gabe von 200 ml - 500 ml der Mischung.

Hinweise

Diaproof Pro sollte nicht gleichzeitig mit Spasmolytika und/oder anderen Elektrolyten verabreicht werden.

1 Mahlzeit alle 12 Stunden, insgesamt 3 Mahlzeiten		Kälber und Fohlen		Lämmer und Ziegenlämmer	
		Wasser oder Milch von 40 °C	Diaproof Pro (50 g - Messlöffel)	Wasser oder Milch von 40 °C	Diaproof Pro (50 g - Messlöffel)
1. Tag	Beginn	2 Liter	2 (100 g)	½ Liter	½ (25 g)
	+ 24 Stunden	2 Liter	2 (100 g)	½ Liter	½ (25 g)
2. Tag	+ 24 Stunden	2 Liter	2 (100 g)	½ Liter	½ (25 g)