



Energan® Calcium

Diät-Ergänzungsfuttermittel

Paste für Milchkühe zur Verringerung der Gefahr von Milchfieber

- für Tiere:
Rinder
- frei verkäuflich



Packungsgrößen:
Packung mit 12 Patronen à

340 g

Zusammensetzung

Calciumpropionat	31,5 % (6,8 % Calcium)
Calciumchlorid	8,2 % (2,97 % Calcium)
Dicalciumphosphat	2,6 % (0,6 % Calcium)
Magnesiumoxid	0,96 %
Propan-1,2-diol	0,87 %
Gesamtgehalt an Calcium	10,40 %

Analytische Bestandteile

Rohprotein	0,3 %
Rohfett	1,0 %
Rohfaser	0,5 %
Rohasche	29,5 %
Calcium	10,4 %
Natrium	< 0,4 %
Phosphor	0,5 %
Magnesium	0,6 %
Feuchte	52,0 %

Verwendungszweck

Energan Calcium ist eine nach High-Tech-Verfahren hergestellte calciumreiche Paste, die rasch resorbiert wird. Sie kann vorbeugend zur Calciumversorgung um den Geburtszeitpunkt oder begleitend bei der Behandlung von Milchfieber eingesetzt werden. Das Besondere ist, dass das hoch aktive CaCl_2 fein dispergiert an Trägerstoffe gebunden ist, wodurch Reizungen der Schleimhäute ausgeschlossen werden. Calciumpropionat hingegen setzt sein Calcium nur verzögert frei und dient somit als ein Calcium- Depot.

Fütterungshinweise

Vorbeugend als Calciumergänzung:

- 1.) 1 Patrone Energan Calcium bei den ersten Geburtsanzeichen (normalerweise 2 – 6 Stunden vor dem Kalben)
- 2.) 1 Patrone Energan Calcium 8 - 12 Stunden später.

Begleitend zu einer Milchfieberbehandlung:

- 1.) 1 Patrone Energan Calcium 2 – 4 Stunden nach der Behandlung durch den Tierarzt,
- 2.) 1 Patrone Energan Calcium 8 - 12 Stunden später.

Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Futtermittelexperten einzuholen.

Anwendung

1. Schneiden Sie den Verschluss der Patrone mit einem Messer ab.

2. Drehen Sie den beiliegenden Applikator auf.
3. Setzen Sie die Patrone in die Energan- Dosierpistole ein.
4. Fassen Sie mit der freien Hand den Maulwinkel des Tieres.
5. Führen Sie die Patrone in Richtung des Zungenrückens ins Maul ein; achten Sie darauf, dass dabei das Tier nicht verletzt wird. Sollte es zu Verletzungen kommen, muss die Gabe unterbrochen und ein Tierarzt zu Rate gezogen werden.
6. Wenn der Griff der Dosierpistole mit den Vorderzähnen in einer Linie liegt, entleeren Sie die Patrone so langsam, dass das Tier den Inhalt abschlucken* kann.

*Nur an Tiere mit normalem Schluckreflex verabreichen.

Lagerung und Haltbarkeit

Unter 35 °C lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.